




Ministry of Civil Affairs


Министарство цивилних послова  
Босне и Херцеговине  
препоручује да сви којима  
се понуди вакцина прихвате и  
приме вакцину!

Но, не заборавимо сви имамо  
право на избор!  
Избор је наш!



Шта су вакцине против КОВИД –19?

Вакцине помажу организму да спречи тежу  
инфекцију вирусом, али вакцине  
**не лијече** од Ковид –19.



Шта је PFIZER-BIONTECH-19 вакцина?

PFIZER-Biontech вакцина стимулише стварање  
антитијела, која ће се везати за вирус и блокирати  
му улаз у станице.  
Ова вакцина **не помаже у лијечењу** већ  
обољелог пацијента.



Зашто се PFIZER вакцине дају у двије дозе?

PFIZER вакцине се дају у двије дозе у распону од  
три седмице или чак и више јер дјелотворност само  
једне дозе није процијена као ваљана и довољна.  
PFIZER вакцине **не треба** примити у једној дози или  
комбиновати са другим вакцинама.



Шта је AstraZeneca вакцина?

AstraZeneca вакцина носи протеине шилка Корона  
вируса и на тај начин узрокује **стварање антитијела**  
која онемогућавају улазак Корона вируса.



Да ли се и AstraZeneca вакцина прима  
у двије дозе?

AstraZeneca вакцина се прима у двије дозе.  
Размак између прве и друге дозе требао би бити  
између четири и дванаест седмица.

Да ли Moderna, Pfizer и AstraZeneca  
вакцине садрже свињску желатину?

Министарство цивилних послова нема сазнања  
да вакцине садрже свињску желатину.

Може ли се од наведених вакцина  
добити болест?

Од вакцина се **не може** добити болест КОВИД – 19.

Могу ли се вакцинисати особе које су  
претходно биле заражене вирусом?

Све особе могу бити вакцинисане осим ако је у  
току акутно обољење.  
У том случају треба сачекати да та фаза заврши.

Смије ли се пити алкохол непосредно  
прије вакцинисања?

Требало би избјегавати алкохол јер у случају  
слабости након вакцинације тешко је одредити  
да ли је алкохол разлог слабости или вакцина.



Могу ли дјеца бити вакцинисана  
против Ковида-19?

Не препоручује се да се PFIZER вакцине дају  
млађима од 16 година, а ни AstraZeneca се  
тренутно не препоручује млађима од 18 година.



Могу ли се појавити неке непријатне  
пропратне појаве од вакцина?

Као и после сваког вакцинисања могуће су  
реакције као што су оток, црвенило, сврбеж,  
главобоља или умор. Могућа је и врућица.  
Све наведено се ублажава на уобичајени начин:  
хладне облоге, много текућине.

Ако су се након вакцинисања првом  
дозом појавиле пропратне појаве  
треба ли одустати од друге дозе?

Не. Треба примити и другу дозу уз савјет љекара.



Да ли је након вакцинације нужно  
поштовати прописане мјере опреза?

Да, након вакцинисања је нужно и даље поштовати  
прописане мјере опреза: ношење маски,  
дезинфекција руку и одржавање физичке дистанце.