




Ministarstvo civilnih poslova
Bosne i Hercegovine
preporuča da svi kojima
se ponudi cjepivo prihvate i
prime cjepivo!

No, ne zaboravimo svi imamo
pravo na izbor! Izbor je naš!



Što su cjepiva protiv COVID – 19?

Cjepiva pomažu organizmu da spriječi težu infekciju virusom, ali cjepiva **ne liječe** od Covid – 19.



Što je PFIZER-BIONTECH-19 cjepivo?

PFIZER-Biontech cjepivo stimulira stvaranje antitijela, koja će se vezati za virus i blokirati mu ulaz u stanice. Ovo cjepivo **ne pomaže u liječenju** već oboljelog pacijenta.



Zašto se PFIZER cjepiva daju u dvije doze?

PFIZER cjepiva se daju u dvije doze u rasponu od tri tjedna ili čak i više jer djelotvornost samo jedne doze nije procijenjena kao valjana i dovoljna. PFIZER cjepiva **ne treba** primiti u jednoj dozi ili kombinirati sa drugim cjepivima.



Što je AstraZeneca cjepivo?

AstraZeneca cjepivo nosi proteine šiljka Corona virusa i na taj način uzrokuje **stvaranje antitijela** koja o nemogućavaju ulazak Corona virusa.



Je li se i AstraZeneca cjepivo prima u dvije doze?

AstraZeneca cjepivo se prima u dvije doze. Razmak između prve i druge doze trebao bi biti između četiri i dvanaest tjedana.

Je li Moderna, Pfizer i AstraZeneca cjepiva sadrže svinjsku želatinu?

Ministarstvo civilnih poslova nema saznanja da cjepiva sadrže svinjsku želatinu.

Može li se od navedenih cjepiva dobiti bolest?

Od cjepiva se **ne može** dobiti bolest COVID – 19.

Mogu li se cijepiti osobe koje su prethodno bile zaražene virusom?

Sve osobe mogu biti cijepjene osim ako je u tijeku akutno oboljenje. U tom slučaju treba sačekati da ta faza završi.

Smije li se piti alkohol neposredno prije cijepjenja?

Trebalo bi izbjegavati alkohol jer u slučaju slabosti nakon cijepjenja teško je odrediti alkohol razlog slabosti ili cjepivo.



Mogu li djeca biti cijepljena protiv Covid –19?

Ne preporuča se da se PFIZER cjepiva daju mlađima od 16 godina, a ni AstraZeneca se trenutno ne preporuča mlađima od 18 godina.



Mogu li se pojaviti neke neprijatne prateće pojave od cjepiva?

Kao i poslije svakog cijepjenja moguće su reakcije kao što su otek, crvenilo, svrbež, glavobolja ili umor. Moguća je i vrućica. Sve navedeno se ublažava na u običajeni način: hladne obloge, mnogo tekućine.

Ako su se nakon cijepjenja prvom dozom pojavile prateće pojave treba li odustati od druge doze?

Ne. Treba primiti i drugu dozu uz savjet liječnika.



Je li nakon cijepjenja nužno poštivati propisane mjere opreza?

Da, nakon cijepjenja je nužno i dalje poštivati propisane mjere opreza: nošenje maski, dezinfekcija ruku i održavanje fizičke distance.